РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№ 3

12 января 2017 г

Официальная информация МЭБ

1. Ирландия: высокопатогенный грипп птиц
2. США: высокопатогенный грипп птиц
3. Румыния: высокопатогенный грипп птиц
4. Швейцария: высокопатогенный грипп птиц
5. Украина: африканская чума свиней
6. Израиль: чума мелких жвачных
7. Франция: слабопатогенный грипп птиц
8. Бельгия: туберкулез КРС

Информация по сообщениям СМИ

1. Украина. В Одесской области зафиксирована очередная вспышка АЧС
2. Чили сообщило о гриппе птиц на индюшачьей ферме, планируется провести убой всех птиц
3. Ирландия. Грипп птиц H5N8 был обнаружен у дикой утки
4. О новых случаях гриппа птиц на территории Европы и Среднего Востока
5. Казахстан. Птичий грипп мог стать причиной гибели лебедей в Актау
6. Китай. В провинции Цзянси зафиксирован новый случай заражения человека вирусом H7N9
7. Китай призвал к ужесточению контроля и профилактики птичьего гриппа H7N9Бруцеллез обнаружен у крупного рогатого скота в Северной Греции
9. В соседних районах Монголии из-за чумы погибли 900 сайгаков
10. США. Герпесвирус лошадей был подтвержден среди лошадей на севере Кентуки
11. Канада сообщила о первом случае заболевания человека гриппом H3N2v
12. По данным отчета: в ЕС обнаружены низкие уровни заболеваемости ТГЭ
13. Индия. Обнаружен африканский штамм вируса блютанга
14. ФАО готовит комплекс мер по борьбе с нодулярным дерматитом КРС в Европе
15. Украина. Лисы атакуют: в Запорожской области зафиксировано бешенство
16. Беларусь. Каждый седьмой случай бешенства животных в области выявлен на Лоевщине

Официальная информация МЭБ

Новые вспышки в ранее благополучных странах



Высокопатогенный грипп птиц[1]

Ирландия

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 28.12.16

Дата срочного уведомления OIE: 10.01.17

---

[1] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22245. – 10.01.2017.

Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Wexford Town, County Wexford, WEXFORD
Дата возникновения: 28.12.16
Вид животных: свиязь (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах

- **Высокопатогенный грипп птиц**[2]

США
Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 27.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 09.01.17
Проявление болезни: субклиническая инфекция
Очаг 1: Fergus County, Fergus, MONTANA
Дата возникновения: 27.12.16
Вид животных: кряква
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N2
Источник инфекции: контакт между дикими видами
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[3]

Румыния
Отчет №6
Дата возникновения первичного очага: 22.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 29.11.16
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Zaboloteni, Zaboloteni, Trifesti, IASI
Дата возникновения: 30.12.16
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: контакт с зараженными птицами на выпасе/водопое
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц

---

[2] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22231. – 10.01.2017.
[3] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22271. – 10.01.2017.

События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[4]



Швейцария

Отчет №8

Дата возникновения первичного очага: 05.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 10.11.16

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Zьrichsee, Zьrich, Zьrich, ZURICH

Дата возникновения: 03.01.17

Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 2: Zurichsee, Zurich, Zurich, ZURICH

Дата возникновения: 03.01.17

Вид животных: сем. чайковые (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 3: Lac Leman, Geneve, Geneve, GENEVE

Дата возникновения: 05.01.17

Вид животных: лысуха (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) хохлатая чернеть (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц

События относятся к зоне внутри страны

- **Африканская чума свиней**[5]



Украина

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 05.01.17

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.17

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Starobilsk, Starobilskiy, LUGANSK

Дата возникновения: 05.01.17

Вид животных: свиньи (чувствительных – 5, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 4, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зони-

---

[4] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22256. – 11.01.2017.

[5] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22261. – 11.01.2017.

рование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных

События относятся к зоне внутри страны

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 12.01.17 г.**

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 12.01.2017 г. на территории Украины выявлено 139 очагов африканской чумы свиней. Из них 122 очага – среди домашних животных и 17 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской и Закарпатской областях.

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. В 2017 году – 1 очаг среди сельскохозяйственных свиней в Луганской области.

Чума мелких жвачных[6]

Израиль

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 08.12.16

Дата срочного уведомления OIE: 10.01.17

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: JERUSALEM, Jerusalem, YERUSHALAYIM

Дата возникновения: 08.12.16

[6] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22225. – 10.01.2017.

Вид животных: нубийский горный козёл (чувствительных – 30, заболело – 14, пало – 13, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus)
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, зонирование, без лечения больных животных
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация
События относятся к зоне внутри страны

- **Слабопатогенный грипп птиц**[7]



Франция
Отчет №6
Дата возникновения первичного очага: 06.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 09.12.16
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Augè, Augè, DEUX-SÈVRES
Дата возникновения: 06.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 4670, уничтожено – 4670)
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Информация по сообщениям СМИ

Украина. В Одесской области зафиксирована очередная вспышка АЧС[8]
В селе Ярославка Саратского района Одесской области был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней (АЧС).
…В фермерском хозяйстве начался массовый падеж свиней. В результате АЧС погибло 65 голов свиней разного возраста. В районе уже создана координационная группа и утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
В настоящее время в Ярославке и 3-х километровой зоне вокруг него была объявлена зона карантина. Так, зоной надзора были определены территории, которые окружают пределы первой зоны радиусом 20 км с. М-Новороссийское, с. Кулевча, с. Сергеевка, с. Розовка, с. Константиновка, с. Надъярное, с. К-Балка, с. Успеновка, с. Заря, с. Плахтиевка, с. Мирнополье, с. Негрово и три хозяйства.
Сейчас готовят к сожжению 65 голов свиней, павших в результате АЧС. Также на территорию карантина был запрещен въезд транспорта, торговля живыми свиньями и продукцией от них на местных рынках, вошедших в зону защиты и надзора.

---

[7] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22220. – 10.01.2017.
[8] URL: http://odpublic.net/news/2017/01/11/zafiksirovana-vspyshka-achs-829497. – 12.01.2017.

Чили сообщило о гриппе птиц на индюшачьей ферме, планируется провести убой всех птиц[9]

Чили обнаружило грипп птиц H7 на предприятии по производству индеек, которым управляет производитель домашней птицы Agrosuper, и которое располагается в регионе Вальпараи́со в центральной части страны. Все пораженные птицы (350 000) будут убиты. Данные относительно типа по нейраминидазе предоставлены не были.

Впервые грипп птиц был диагностирован в Чили и Южной Америке в мае 2002 года. Эпидемия была вызвана подтипом H7N3 ВПГП, который возник из низкопатогенного вируса…

Ирландия. Грипп птиц H5N8 был обнаружен у дикой утки[10]

Ирландия обнаружила штамм H5N8 гриппа птиц у дикой утки в юго-восточном городе Уэксфорд…

Официальные лица сообщили о новых случаях гриппа птиц на территории Европы и Среднего Востока[11]

Продолжающиеся вспышки в Европе

Как Германия, так и Франция сообщили о новых случаях ВПГП H5N8. Начиная с 29 декабря, 25 индеек пали и еще 12 225 были уничтожены на птицеферме в Худе в немецкой земле Нижняя Саксония. Германия была одной из первых стран Европы, 2 месяца назад сообщивших о широкомасштабной активности H5N8.

Франция сообщила о 23 новых вспышках H5N8 на фермах в юго-западной оконечности страны. Вспышки начались 22 декабря и в настоящий момент продолжаются. Многие птицы продемонстрировали клинические симптомы H5N8 и содержались на фермах, расположенных в зонах по надзору предыдущих вспышек. В 19 из 23 вспышках на фермах фигурировали утки, при этом, в общей сложности, пали 479 и были убиты 12 512 птицы. Еще 117 014 птиц являются восприимчивыми, при этом ВОЗЖ сообщило, о том, что будет проводиться надзор.

По информации BBC, в Соединенном Королевстве также была отмечена новая вспышка H5N8 в лебедином хозяйства Abbotsbury Swannery, Дорсет. Девять лебедей при исследовании показали положительную реакцию на вирус. На настоящий момент этой зимой хозяйство с лебедями сообщило о падеже 80 птиц, притом, что в случае с большинством предыдущих лет отмечалась лишь половина от данного количества. Данное лебединое хозяйство является единственной в мире колонией гнездящихся лебедей шипунов, находящейся под управлением человека.

H5N8 был подтвержден у домашней птицы в Чешской Республике, Хорватии и Румынии

Чешская республика подтвердила первые на своей территории вспышки H5N8 в двух стадах птиц частных подворий в южной части страны. По первоначальным сообщениям в СМИ, был обнаружен H5 и в настоящий момент проводятся дальнейшие исследования.

Первая вспышка началась недалеко от города Моравски-Крумлов 4 ноября, где от ВПГП пали 10 птиц и еще 76 были уничтожены. В тот же день, 20 индеек пали в со-

---

[9] URL: http://en.mercopress.com/2017/01/07/chile-reports-avian-influenza-at-a-turkey-farm-all-birds-to-be-culled. – 07.01.2017.

[10] URL: http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=1868&PID=0&IID=47224/. – 31.12.2016.

[11] URL: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/01/officials-report-more-avian-flu-across-europe-middle-east. – 09.01.2017.

седнем городе Иванчице. По информации ВОЗЖ, обе вспышки произошли в частных подворьях, на которых имел место контакт с дикими птицами.
Вспышка H5N8 в Хорватии, где ранее отмечались вспышки лишь среди диких птиц, так же произошла в стаде частного подворья. 27 декабря 15 кур и 1 индейки были обнаружены павшими в городе Питомача на границе с Венгрией. Еще 25 восприимчивых птиц были уничтожены. Тем временем, Румыния сообщила еще о двух вспышках H5N8, одна из которых произошла среди диких птиц, а другая представляла собой первый случай обнаружения данного вируса среди домашней птицы в стране. Вспышки начались 28 декабря, при этом в ней фигурировали три диких лебедя, обнаруженных на озере Фортуна и 22 птицы частного подворья расположенного по соседству, еще 169 голов домашней птицы были уничтожены.

События в Иране и Тайване

Иран сообщил о 5 новых вспышках H5N8 на территории северной части страны. На территории одной птицефермы и в четырех стадах частного подворья было 3 069 случая падежа и еще 166 453 птицы были вынуждено убиты. По информации МЭБ вспышки начались 18 и 25 декабря, при этом на соседних фермах продолжается активный надзор.
…Сегодня Тайвань сообщил о второй на своей территории вспышке H5N2 в новом году, на куриной ферме в Юньли́нь. По информации китайского государственного новостного агентства Xinhua, 2,672 курицы были убиты с целью предупреждения дальнейшего распространения инфекции.

Казахстан. Птичий грипп мог стать причиной гибели лебедей в Актау[12]

…Несколько мёртвых молодых лебедей обнаружили жители Актау на побережье Каспия… Все погибшие птицы - молодняк, рассказали эксперты.
Независимые экологи отмечают, что это второй случай гибели птиц. Ещё один был в декабре.
"Факты гибели лебедей отмечаются каждый год, как правило, это единичные случаи: одна-две тушки. В этом году было обнаружено три лебедя, и это только в январе. Несколько случаев было в начале декабря, когда только начинался сезон перелёта. Причин можно назвать несколько, в частности, это рацион питания. Это могут быть инфекционные заболевания – распространённый птичий грипп. Были случаи массовой гибели несколько лет назад, но не у нас в Казахстане, а в России, в частности, отмечались сотни случаев гибели птиц. И человеческий фактор также не исключается, то есть, возможно, физическое воздействие на птицу", – рассказал о возможных причинах гибели лебедей директор НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.
Тушки погибших птиц забрали на экспертизу. …Точная причина гибели будет установлена через пару недель.

Китай. В провинции Цзянси зафиксирован новый случай заражения человека вирусом H7N9[13]

Комитет по делам здравоохранения и планового деторождения провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня проинформировал о выявленном в провинции случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Заболевшая – 50-летняя жительница города Наньчан…

---

[12] URL: https://informburo.kz/novosti/ptichiy-gripp-mog-stat-prichinoy-gibeli-lebedey-v-aktau-ekologi.html. – 12.01.2017.
[13] URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0112/c31516-9165794.html. – 12.01.2017.

Китай призвал к ужесточению контроля и профилактики птичьего гриппа H7N9[14]Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР призвал увеличить усилия по профилактике и контролю за распространением птичьего гриппа H7N9.
Комитет выступил с таким призывом после поступления сообщений о случаях заражения людей вирусом H7N9 в пров. Цзянси и Хунань в последние дни.
Опасность распространения штамма птичьего гриппа H7N9 обычно возрастет зимой и весной. Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний отметили, что в Китае уже начался сезон повышенной опасности вспышки гриппа H7N9, и возможность выявления новых случаев инфекции в части южных районов Китая не исключена. Эксперты рекомендовали жителям избегать контактов с мертвой и живой птицей и их отходами и приобретать только сертифицированную продукцию птицеводства.

Бруцеллез обнаружен у крупного рогатого скота в Северной Греции[15]
Шестьдесят голов крупного рогатого скота на животноводческой ферме в районе Скити, на севере Греции, были отправлены на убой после того, как анализы крови показали, что более половины животных были заражены бруцеллезом… Заболевание, вызываемое бактерией Brucella, было выявлено более чем у 30 животных во время проверки ветеринарным агентством… Бруцеллез у крупного рогатого скота в регионе был выявлен впервые за последние девять лет… О введении карантина речь пока не идет.

В соседних районах Монголии из-за чумы погибли 900 сайгаков[16]
Число антилоп-сайгаков, погибших из-за чумы крупного рогатого скота в Западной Монголии, достигло 900 особей, говорится в материалах Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии.
Туши умерших сайгаков обнаружены на территории девяти округов двух западных провинций Монголии – Ховд и Говь-Алтай. По словам экспертов, причиной гибели этих диких животных в большом количестве является чума. Администрации этих двух провинций ввели карантин и проводят повсеместную дезинфекцию.
…На экстренном совещании правительство Монголии попросило оказать международную помощь для предотвращения распространения чумы крупного рогатого скота среди диких животных.

США. Герпесвирус лошадей был подтвержден среди лошадей на севере Кентуки[17]
Управление ветеринарии штата Кентукки и Коммуникационный центр по болезням лошадей сообщили о том, что ГВЛ-1 был подтвержден на территории хозяйства на севере Кентукки. Кобыла в возрасте 2 лет, содержащаяся в округе Олдем, была доставлена в госпиталь лошадей в Лексингтоне 4 января для обследования на предмет неврологической болезни.

---

[14] URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0111/c31516-9165699.html. – 11.01.2017.
[15] URL: http://meatinfo.ru/news/brutsellez-obnarugen-u-krupnogo-rogatogo-skota-v-severnoy-gretsii-367159. – 11.01.2017.
[16] URL: http://www.gorno-altaisk.info/news/71426. – 12.01.2017.
[17] URL: http://www.thehorse.com/articles/38648/ehv-confirmed-in-northern-kentucky-horses. – 09.01.2017.

Канада сообщила о первом случае заболевания человека гриппом H3N2v[18]

16 декабря ВОЗ был уведомлен о подтвержденном случае вариантного вируса гриппа A(H3N2) у человека в Канаде. По информации Отчета о гриппе на уровне взаимодействия между животными и человеком, 24 октября у пациента возникли симптомы респираторной инфекции, 8 ноября он был госпитализирован с диагнозом пневмония, а затем выздоровел. Точное местонахождение случая расположение в Канаде в отчете указано не было. Пациент подтвердил, что контактировал с больными свиньями на ферме. Проводятся ветеринарные и эпидемиологические расследования.

Частичный анализ последовательности всех 8 сегментов гена данного вируса изолированного в пробах от пациента показывает, что эти сегменты близкородственны вирусам гриппа птиц A(H3N2), которые в настоящий момент циркулируют среди свиней в Северной Америке.

Это первый случай инфицирования человека вирусом гриппа H3N2v подобным A/Indiana/08/2011, о котором Канада сообщила в ВОЗ…

Вирусы гриппа A(H1N2) и A(H3N2) циркулируют в популяциях свиней во многих регионах мира. В зависимости от географического расположения генетические характеристики данных вирусов разняться. В большинстве случаев заболевания люди подвергаются воздействию вирусов свиного гриппа при контакте с инфицированными свиньями или контаминированными средами…

По данным отчета: в ЕС обнаружены низкие уровни заболеваемости ТГЭ[19]

Недавно Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовало свой первый сводный отчет по ЕС, относительно мониторинга трансмиссивных губкообразных энцефалопатий среди КРС, овец и коз, в котором говорится об обнаружении низких уровней заболеваемости.

Ранее, ежегодные отчет по различным трансмиссивным губкообразным энцефалопатиям составлялись Комиссией ЕС.

Трансмиссивные губкообразные энцефалопатии представляют собой группу болезней, которые поражают мозг и нервную систему людей и животных. За исключением классической ГЭКРС, свидетельства того, что трансмиссивные губкообразные энцефалопатии могут передаваться людям, отсутствуют.

В государствах-членах ЕС было обнаружено небольшое количество случаев ГЭКРС среди КРС, при этом ни одно животное, фигурировавшее в данных случаях, не попало в пищевую цепь.

В отчете сообщается, что пять случаев ГЭКРС среди КРС были отмечены в ЕС в 2015 году, из приблизительно 1,4 миллионов протестированных животных.

Данные пять случаев были обнаружены в четырех государствах-членах: 1 случай в Ирландии, 1 случай в Словении, 1 случай в Испании и 2 случая в Соединенном Королевстве. Один случай был обнаружен в Норвегии.

Как показывает отчет Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, два случая в Ирландии и Соединенном Королевстве были поражены классической формой ГЭКРС, при этом оба животных были рождены после запрета относительно кормов, установленного на всей территории ЕС в 2001 году.

Оставшиеся четыре случая были представлены атипичной формой ГЭКРС (три случая типа L и один случай типа H ГЭКРС).

---

[18] URL: http://outbreaknewstoday.com/canada-reports-first-human-case-h3n2v-influenza-45405/. – 28.12.2016.

[19] URL: http://www.agriland.ie/farming-news/low-incidences-of-tse-found-in-the-eu-report/. – 03.01.2017.

По информации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, с 2001 года приблизительно 114 миллионов голов КРС в ЕС были протестированы на ГЭКРС. В 2015 году в ЕС среди 319 638 протестированных овец и 135 857 коз было отмечено 641 и 1 052 случая скрепи (тип ТГЭС) соответственно.
В отчете говорится, что в ходе надзора на предмет скрепи, проводимого на всей территории ЕС, с 2002 года было протестировано приблизительно 8,4 миллионов мелких жвачных…

Индия. Обнаружен африканский штамм вируса блютанга[20]
Исследователи из города Хайдарабад обнаружили новый штамм вируса, который вызывает блютанг среди овец, КРС, домашних питомцев и диких животных, что представляет собой серьезную причину для беспокойства. Новый штамм вируса блютанга был назван BTV-24.
До настоящего момента распространение данного штамма было ограничено Африкой, и его присутствие у животных в Телингана и Áндхра-Прадéш говорит, либо об эволюции существующих штаммов, либо о его случайном заносе в Индию.
…Ввиду того, что каждому штамму соответствует конкретная вакцина, теперь исследователям требуется разработать новую вакцину для решения этой новой проблемы.
…Всего в мире существуют 27 штаммов вируса блютанга, 21 из которых присутствует в Индии. Теперь с обнаружением STV-24 их количество достигло 22.
…Кроме Африки данный штамм был ранее обнаружен в Средиземноморье и в Северной и Южной Америке. Он является экзотическим для Индии…

ФАО готовит комплекс мер по борьбе с нодулярным дерматитом КРС в Европе[21]
Вирус нодулярного дерматита возник в Турции в 2013 году, позднее распространился в России и Греции, а затем охватил территорию Балкан.
Сегодня вирус угрожает и Европе, в связи с чем ФАО намерена сосредоточить свои усилия и технические возможности на реализации двух региональных проектов, направленных на профилактику и контроль за его распространением…
Правительства стран опасаются введения торговых ограничений в случае, если вирус проникнет на их территорию.
…В ФАО сообщили, что особое внимание будет уделено Грузии, где первые случаи болезни были зарегистрированы в конце 2016 года. По запросу грузинской ветеринарной службы в этой стране будет размещена миссия экспертов ФАО. Эта группа экспертов будет осуществлять оценку эпидемиологической ситуации и подготовку национальных кадров с тем, чтобы грузинская ветеринарная служба смогла справиться с болезнью…

Украина. Лисы атакуют: в Запорожской области зафиксировано бешенство[22]
Жители запорожского села Воскресенка Пологовского района Запорожской области жалуются на нашествие диких лис. Животные не боятся людей и нападают на домашнюю птицу. Недавно во двор к местной жительнице пробралась дикая лиса, зараженная бешенством, и покусала пса. Тот в свою очередь набросился на хозяйку. Пса пришлось убить…

---

[20] URL: http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/African-strain-of-bluetongue-virus-found/articleshow/56227608.cms. – 29.12.2016.
[21] URL: http://www.dairynews.ru/news/fao-gotovit-kompleks-mer-po-borbe-s-novoy-boleznyu.html. – 11.01.2017.
[22] URL: http://zanoza-news.com/?p=78861. – 10.01.2017.

Беларусь. Каждый седьмой случай бешенства животных в области выявлен на Лоевщине[23]

Как сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья за прошлый год на Гомельщине выявлено 270 случаев бешенства животных. Наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваемости. Для сравнения в 2015 году в регионе официально подтверждено 230 случаев бешенства. Согласно итоговым данным, больше всего фактов заражения животных выявлено в Лоевском районе — 39, на втором месте Брагинский район — 31, на третьем Буда-Кошелевский — 26. Самым благополучным регионом оказался Наровлянский район, где за год не было ни одного случая бешенства животных. Три случая зафиксированы в Октябрьском районе, по три — в Житковичском, Кормянском, Мозырском и Чечерском. Среди животных, зараженных бешенством, статистика такова: крупный рогатый скот — 91, лисы — 61 и собаки — 52. В список попали волки, коты, крысы, лоси, а также один хорек, белка и рысь…

[23] URL: http://gp.by/category/news/health/news127273.html. – 10.01.2017.