


Эпизоотическая ситуация по ящуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 - 2016 гг.

(на 09.11.2016 г.)



Серотип вируса:

- - тип А
- - тип Asia1
- - тип О
- - тип SAT1
- - н/т

Клинические проявления болезни:

1. Армения (1) - тип А
2. Афганистан (332) - типы А, О, SAT-1, Азия-1, н/т
3. Бангладеш - н/т
4. Бахрейн (2) - тип О
5. Бутан (26) - типы О, н/т
6. Вьетнам (117) - типы А, О, н/т
7. Гонконг (8) - тип О, н/т
8. Израиль (2) - тип О
9. Индия (284) - типы О, Азия-1, н/т
10. Ирак (300) - типы А, О, н/т
11. Иран (2250) - типы А, О, н/т
12. Камбоджа (104) - тип А, О, Азия-1, н/т
13. Катар (17) - тип О
14. Кипр (8) - тип А
15. Кувейт (5) - тип О
16. Кувейт (12) - тип О, н/т
17. Кыргызстан (1) - типы А, О
18. Малайзия (9) - тип О
19. Монголия (20) - тип О
20. Мьянма (31) - тип О, н/т
21. Непал (117) - типы О
22. ОАЭ (1) - тип О
23. Оман (792)
24. Пакистан (40) - типы А, О, Азия-1
25. Палестинская АТ (63) - тип О
26. Россия (3) - тип А
27. Саудовская Аравия (2) - тип А
28. С. Корея (24) - тип О
29. Таиланд (382) - типы А, О, н/т
30. Тайвань (2) - тип А
31. Турция (825) - типы А, О, Азия-1, н/т
32. Шри-Ланка (195) - тип О
33. Ю. Корея (208) - тип О

Болезнь эндемична:

1. Вьетнам - тип Азия 1
2. Ливия - тип О
3. Палестинская АТ - тип О
4. Турция - тип А

Страна (кол. очагов) - тип вируса

